

I più comuni errori nell'uso dei fillers e della tossina botulinica.

L.Piovano

Le complicanze da fillers sono aumentate notevolmente negli ultimi decenni parallelamente all'incremento dell'utilizzo di tali dispositivi medici. Sempre più frequentemente i medici coinvolti non hanno una formazione specifica e si "avventurano" a tali pratiche spinti dalle aziende produttrici e dal facile guadagno.

Le complicanze sono in effetti legate per il 90% dei casi ad errata indicazione, errata tecnica di impianto, errata selezione/condotta del paziente.

Ne deriva che pur trattandosi di procedure di Medicina Estetica le relative complicanze sono di tipo chirurgico, pur sempre senza una soluzione delle problematiche.

L'utilizzo della Tossina Botulinica vede spesso complicanze transitorie per lo più legate all'iperdosaggio od errata tecnica infiltrativa. Queste sono per lo più di breve durata con restituzio ad integrum completa.

Quanto detto sopra, è particolarmente evidente nei trattamenti del viso, non tanto nei riempimenti superficiali di rughe o solchi, quanto piuttosto nel reintegro volumetrico e morfologico di aree anatomiche al fine di riequilibrare le unità estetiche.

Gli Autori forniscono soluzioni per prevenire tali complicanze in tema di competenze, qualificazione, indicazioni, tecniche iniettive corrette.