



10
CONVEGNO
NAZIONALE
AIDECO

MILANO
16-17
NOVEMBRE
2017
Marriott Hotel
Via Washington, 66



Presidente
Leonardo Celleno

Nevi ed emangiomi: problematiche psicosociali

Frasin Lucretia Adina

I nevi sono comuni proliferazioni dei melanocitici presenti già alla nascita (nevi congeniti) oppure comparsi durante l'infanzia e l'adolescenza (nevi acquisiti). Gli emangiomi capillari sono i più frequenti tumori vascolari benigni dell'infanzia, di solito con regressione spontanea entro i 5 anni di vita.

Generalmente sono lesioni cutanee benigne ma talvolta, sia i nevi che gli emangiomi possono presentare delle complicanze, più o meno gravi durante la loro storia naturale. Per quanto riguarda gli emangiomi l'ulcerazione, il sanguinamento, e soprattutto la compromissione della respirazione nel caso di un emangioma laringeo oppure di altre funzioni come la vista, l'udito sono complicanze serie con trattamento immediato. Non va sottovalutato l'impatto psicologico sui bambini affetti da emangiomi complicati: i genitori devono monitorare attentamente l'eventuale comparsa di disagio o difficoltà sociale, in modo da poter fornire un eventuale supporto psicologico. Il disagio estetico e le implicazioni psicologiche sono fattori importanti da considerare nella decisione di trattare un emangioma infantile.

I nevi melanocitici congeniti con dimensioni oltre i 20 cm sono considerati grandi e giganti nel caso in cui superano i 40 cm. Più esteso è il nevo congenito più aumenta il rischio di complicanze cioè la comparsa di melanoma in sede della lesione, associazione con diverse malformazioni somatiche tra cui la spina bifida e l'associazione con la melanosì neurocutanea. La maggior parte dei NMC sono certamente antiestetici ed alcuni di essi si possono considerare deturpanti, ciò che può essere causa di potenziali effetti psico-sociali, sia per il bambino che per la famiglia. La scelta terapeutica non è semplice e deve tener conto di vari fattori individuali considerando caso per caso; comunque la maggioranza degli esperti sono a favore di un trattamento precoce mentre la tecnica più usate rimane l'asportazione a tutto spessore con posizionamento di espansori cutanei.