

## **La terapia topica dell'acne del dorso**

**L.Miccoli, M.V.Tolaini, L.Celleno.**

L'acne è una dermatosi polimorfa che spesso interessa fasce di popolazione diverse da quella giovanile e si localizza non solo sul volto ma anche in altre aree cutanee quale il dorso. Il trattamento di tali localizzazioni, soprattutto in soggetti adulti sia maschili che femminili in età non più adolescenziale, pone spesso delle limitazioni alle terapie sistemiche e topiche dovute sia alle abitudini di vita dei pazienti che alla difficoltà intrinseca di trattare adeguatamente tali aree particolari.

Per tali motivi abbiamo voluto verificare l'efficacia di un prodotto spray a base di zinco acetato, acido laurico e acido salicilico ideato per il trattamento di superfici acneiche estese e difficilmente raggiungibili.

Lo zinco acetato è dotato di attività sebo regolatrice ed anti infiammatoria, mentre l'acido laurico svolge un'efficace azione antibatterica. L'acido salicilico contenuto a basso dosaggio (1% ) permette una delicata azione cheratolitica.

Il trattamento con tale prodotto in monoterapia si è rivelato efficace e di elevato gradimento per i pazienti per la facilità delle sue modalità applicative. Tali caratteristiche ne fanno un prodotto ideale per il trattamento delle localizzazioni acneiche "difficili" come l'acne del dorso.